


Algunas otras noticias que hemos leído sobre grasa animal y enfermedades animales y/o de transmisión animal, solo durante los últimos once meses:

La mayor parte de las noticias proceden de “Agrodigital.com” (que llamaremos ADC) y de “Agroinformación.com” (que llamaremos AIC); damos nombre completo de las demás fuentes.-

“La Vanguardia, 26.XII.03”: Alerta en EE.UU. por una vaca loca; los seis países que importan el 75 % de la carne que exporta le han cerrado sus fronteras; más de 180.000 reses infectadas en 23 países; hay riesgo de que la infección se transmita a personas.- “Idem., 21.XII.03”: según un estudio de riesgo de la Universidad Rovira y Virgili y su investigador J.L. Domingo: hay que preferir la leche desnatada a la semidesnatada, pues ésta mejor que la leche entera.- “ADC, el 11.XII.03”: según el PSOE, el Ministerio de Agricultura, después de 3 años, está desbordado por las vacas locas.- “AIC, el 26.XI.03”: hay Fiebre de West Nile en Marruecos, afecta a los caballos, muy próximos a España.- “El País, 10 y 14.VI.03”: en EE.UU. Se registra el primer brote occidental de la “viruela del mono”, que ha sido transmitido a 13 personas, por los “perros de la pradera”.- “ABC y El Mundo, 24.V.03”: la civeta, pequeño mamífero salvaje, que se come en el Sureste de China, es la fuente probable de contaminación del SRAS (la famosa y mortal “neumonía atípica”).- “ADC, 30.IV.03”: El director de I+D de Laboratorios SYVA expuso en Fregenal de la Sierra los avances en el control del “mal rojo”.- “AIC, 30.IV.03”: Detectado un caso de “Scrapie” en una explotación de ovejas y cabras de Tembleque.- “ADC,30.IV.03”: lo mismo.- “ADC,9.IV.03”: Detectado un caso de “Scrapie” en una explotación de ovejas y cabras, de Pozuelo (Albacete).- “A CAPITAL, 3.IV.03”: Encontrados nitrofuranos en la carne de cerdo portuguesa.- “Diario do SUL, 3.IV.03”: En conciencia hay que retirar los nitrofuranos (encontrados en las aves de 47 explotaciones avícolas).- “Diario de Noticias, 1.IV.03”: Se prohíbe en Portugal el nitrofurano en los animales de consumo humano.- “La Razón, 26.III.03”: Un estudio revela que la EEB puede incubarse en humanos durante 16 años; El ejército británico cava una fosa para enterrar 500.000 animales con fiebre aftosa.- “AIC, 14.III.03”: detectado el séptimo caso de vaca loca (en lo que va de año) en Cataluña.- “ADC, 13.III.03”: detectadas dioxinas en explotaciones lecheras en Italia.- “El País, 8.III.03”: Badiola cree que aumenta el riesgo de casos humanos de vacas locas; la incubación en las vacas suele durar 5 años.- “ADC,4.III.03”: El consumo de pollo cae en picado en Portugal, por el nitrofurano.- “AIC,26.II.03”: se confirma un caso de tembladera (“Scrapie”) en una explotación de ovejas y corderos, de Salamanca.- “ADC, 26.II.03”: Casi 1.000 casos de “Scrapie” en ovino en la UE, durante los once primeros meses de 2002.- “AIC, 21.II.03”: Holanda mantiene el bloqueo de 157 granjas, por un posible contagio con dioxina; al parecer procedía de una partida de 100 Tm de pienso de Thurnigen (Alemania).- “ADC, 14.II.03”: Holanda obliga a que todas las explotaciones ganaderas tengan un lavadero de camiones.- “ADC,5.II.03: desde 1990, en el Reino Unido se han producido 831 casos de



Creutzfeld-Jakob de los que 122 corresponden a la variedad vinculable a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).- “ADC,4.II.03”: en Japón se hacen interesantes especulaciones sobre la relación entre casos de EEB y los sustitutos lácteos usados en la alimentación de los animales.-



Después de haber leído todo esto, el que quiera puede seguir alimentando con grasa animal a sus animales, y que tenga suerte!